



Tierärztliche Vereinigung für
Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit (TVL)

Association vétérinaire pour
la sécurité alimentaire et
la santé animale (AVSA)

Impfungen gegen aktuelle Kaninchenkrankheiten

Manfred J. Lang, Provet AG

3. November 2016



Kaninchenkrankheiten

- VHD / RHD
- Myxomatose
- Kaninchenschnupfen
- Enterokolitis
- Kokzidiose



RHD / VHD

- Erreger: Calicivirus
 - 1988: Typ 1 festgestellt in Deutschland
 - 2010: Typ 2 in Frankreich, Italien, GB, ...
- 50% tote Kaninchen trotz Impfung mit Typ 1
- Impfstoff mit Typ 1 + 2: Filavac VHD K C+V
- Zulassung in Frankreich: 2016
 - über Sonderimport in CH erhältlich

Filavac VHD K C+V


- Impfung ab 10. Lebenswoche
- Grundimmunisierung: 1 Impfung
- Booster alle 12 Monate
- Impfschutz 7 Tage nach Impfung



Myxomatose

- Erreger: Leporipoxvirus
- Akute Form: Bindehautentzündung, 99% Mortalität
- Schleichende Form: derbe Knoten in Haut, Schwellungen, «Löwenkopf»
- In der Schweiz eine zu bekämpfende und meldepflichtige Tierseuche
- Kein Impfstoff zugelassen, Sonderimport nicht möglich

Myxomatose mit Hautknoten



Kaninchenschnupfen

- Erreger: *Pasteurella multocida*,
Bordetella bronchiseptica
- Symptome: kurzes, trockenes Niesen, seröser bis eitriger Nasenausfluss, häufig chronisch
- Impfung: prophylaktisch
- Grundimmunisierung: 2 x, Booster: alle 6 Mt.



Enterocolitis der Kaninchen

- Erreger: Clostridium perfringens Typ A und C
- Symptome: süßlich stinkender Durchfall mit Schleimbesatz
- Mortalität bis 100 %
- Häufig multifaktoriell: Stress, E. coli, etc.
- Impfung schützt gegen Vermehrung von C. perfringens Typ A, alpha und beta 2 Toxin
- Mutterschutzimpfung, Jungtiere ab 3. Woche



Kokzidiose

- Erreger: *Eimeria perforans*, *E. media*, *E. irresidua*, *E. magna*, u.v.a.m.
- Symptome: Teilnahmslosigkeit, Bauchschmerzen, kotverschmierter Hinterteil
- Impfung: bis jetzt keine
- Metaphylaxe oder Therapie medikamentell



Fragen?

